



CASO CLINICO

recibido: Marzo 2026

aceptado: Abril 2026

Compensación ortodóntica de clase III esquelética y dentaria

Orthodontic camouflage treatment for skeletal and dental Class III malocclusion

Resumen: tratamiento de paciente adolescente con técnica multibracket y extracción de segundos premolares inferiores y anclaje medio

Abstract: Treatment of an adolescent patient using the multibracket technique, extraction of mandibular second premolars, and moderate anchorage.

Palabras clave: Clase III, multibracket, compensación ortodóntica
Keywords: Class III, multi-bracket, orthodontic compensation

Claudio Suárez

Dr. en Odontología UDELAR
Especialista en ortopedia y ortodoncia MF IUCEDDU

Clinica de Ortodoncia Iuceddu
email: dr.claudiosuarez@gmail.com

PACIENTE: Romina

FECHA DE NACIMIENTO: 11 de Junio 2004

EDAD: 12 años 10 meses

SEXO: Femenino


Primera menstruación a los 11 años.

Ingreso : 18 de Marzo de 2017

Motivo de consulta: “poder comer bien”


Estudio de la estética facial

LINEA MEDIA SAGITAL E INTERPUPILAR




- desvío mentón hacia la izquierda.

ESTUDIO DE LOS TERCIOS FACIALES




- Tercio inferior aumentado.
- Perfil recto.
- Incompetencia labial.

DIVISION DE LA CARA EN QUINTOS



- Quintos simétricos




ANGULO SUBNASAL

Angulo subnasal total.: 118°
(90° a 105 normal) **AUMENTADO**

Angulo subnasal sup.: 30°
(15° a 20 normal) **AUMENTADO**

Angulo subnasal inf.: 88°
($85^{\circ} \pm 5$ normal) **NORMAL**

TRIANGULO ESTETICO DE POWEL



Angulo Naso Frontal: 145°
(115° a 130° normal)

AUMENTADO

Angulo Naso Facial: 32°
(30° a 40° normal)

NORMAL


Angulo Naso Mental: 133°
(120° a 132° normal)

AUMENTADO

Angulo Mento Cervical: 83°
(80° a 95° normal)

NORMAL


ANGULO DE LA CARA INFERIOR DE LEGAN



Angulo de Legan: 85°
($100^{\circ} \pm 7$ normal)

DISMINUIDO

VERTICAL DE SPRADLEY





Labio superior: + 1 mm

Labio inferior: + 2 mm

Pogonion cutaneo: + 2 mm
(fuera de la norma)

NO DECRECIENTE

DIAGNÓSTICO ESTÉTICO



- PERFIL: Recto.
- TERCIOS FACIALES: Inferior aumentado.
- LINEA MEDIA: Leve desviación del mentón a la izquierda.
- ANGULO SUBNASAL SUPERIOR: Aumentado.
- ANGULO NASO FRONTAL: Aumentado.
- ANGULO NASO MENTAL: Levemente aumentado.
- ANGULO DE LEGAN: Disminuido.

ESTUDIO DE LA ESTÉTICA DENTAL




CORRECTO

- Coincidencia de líneas medias dentarias.
- Coincidencia de línea media dentaria y facial
- Arco de la sonrisa con concavidad superior.
- Corredores bucales estéticamente aceptables.

INCORRECTO

- Exposición de incisivos superiores disminuida.
- Sin exposición de encía anterior.
- Con exposición de encía posterior.
- Exposición de incisivos inferiores.



Exámen clínico





- No presenta restauraciones.
- Encía clínicamente sana.
- Biotipo periodontal mediano.
- Buena higiene oral.
- Frenillo labial superior e inferior normales.
- No presenta exudado ni sangrado inflamatorio.
- No presenta movilidad dentaria.

CONCLUSIONES SOBRE EL EXAMEN FUNCIONAL

- AFMP: Simétricos.
- Trayecto de RC a OM: sin desvíos en plano frontal y sagital (coincidencia centrica y máxima)
- ELIO: Simétricos.
- ATM: Sin signos y síntomas de patologías.
- Trayecto de apertura y cierre: Recto.

ORTOPANTOMOGRAMFIA




- Senos Maxilares: Neumatizados.
- Imagen de cornetes hipertróficos.
- Cóndilos y cuellos: Simétricos y a la misma altura.
- Existencia de terceros molares intraóseos.



TELERRADIOGRAFIA DE PERFIL

- Doble imagen de borde mandibular.
- Hioides bajo.
- Incompetencia labial.
- Poco desarrollo sagital del tercio medio.

ANALISIS CEFALOMETRICO LATERAL BASICO DE RICKETTS



- Clase III ósea.
- Braqui Facial Severo
- Eje facial cerrado

Maxilar Inferior					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Eje Facial	96°	90° ± 3°	6°	x	BraquiFacial
Profundidad Facial	93°	88° ± 3°	4°	x	BraquiFacial
Angulo Plano Mandibular	25°	25° ± 4°	-0°		MesoFacial
Altura Facial Inferior	44°	47° ± 4°	-3°		MesoFacial
Arco Mandibular	31°	28° ± 4°	4°		Normal

Maxilar Superior					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Convexidad	-1,6	1,3 ± 2,0	-2,8	-x	Clase III Osea
Profundidad Maxilar	91°	90° ± 3°	1°		Normal


Dientes					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Protrusión II	3,7	1,0 ± 2,3	2,7	x	Protrusión
Inclinación II	25°	22° ± 4°	3°		Normal
Posición Molar Superior	15,8	15,8 ± 3,0	0,1		Clase I
Extrusión II	-0,8	1,3 ± 2,0	-2,0	-x	Intruido
Angulo Interincisivo	134°	132° ± 6°	2°		Normal

Perfil Blando					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Protrusión Labial	-2,2	-2,8 ± 2,0	0,5		Normal

Nombre Medida	Valor	Media	Vert	Tipo	DÓLICO	MESO	BRAQUI
Eje Facial	95,5	90,0	1,8	BRAQUI			
Profundidad Facial	92,7	88,1	1,5	BRAQUI			
Angulo Plano Mandibul:	24,8	24,9	0,0	MESO			
Altura Facial Inferior	43,9	47,0	0,8	MESO			
Arco Mandibular	31,4	27,9	0,9	MESO			

VERT = 1,0 Braqui Facial Severo.

EVALUACION CEFALOMETRICA DE MCNAMARA



Maxilar a Base del Cráneo

Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Dist A a $\perp$ Na-FR	1,1	0,4 $\pm$ 1,0	0,7		Normal
Angulo Nasolabial	109°	102° $\pm$ 8°	7°		Normal

Maxilar a Mandíbula

Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Longitud Maxilar	80,3	90,8 $\pm$ 4,0	-10,4	-xx	Disminuido
Longitud Mandibular	115,4	114,5 $\pm$ 4,0	0,9		Normal
Diferencia Max. - Mand.	35,1	23,8 $\pm$ 4,0	11,3	xx	Aumentado
Altura Facial Anterior Inf.	62,8	62,8 $\pm$ 4,0	0,0		Normal
Angulo Plano Mandibular	25°	25° $\pm$ 4°	0°		Normal
Eje Facial Mc Namara	84°	90° $\pm$ 3°	-6°	-x	Disminuido

Mandíbula a Base del Cráneo

Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Dist Pg. a $\perp$ Na-FR	5,2	-4,4 $\pm$ 2,0	9,5	xxxx	Aumentado

Dentición


Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Distancia IS - A	5,7	5,0 $\pm$ 1,0	0,7		Normal
Distancia II a Plano A- Pg	3,7	2,0 $\pm$ 1,0	1,7	x	Aumentado

Medidas Aéreas

Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Longitud Inferior Faringe	23,5	12,5 $\pm$ 3,0	11,0	xxx	Aumentado
Longitud Superior Faringe	12,1	17,5 $\pm$ 3,0	-5,4	-x	Disminuido

- Exceso de 15 a 18 mm de longitud mandibular respecto al maxilar.
- Altura facial inferior aumentada 5 mm.
- Pogonion adelantado respecto a perpendicular (+5.2).
- Longitud superior de faringe disminuida.

ANALISIS DE ROTH - JARABAK



Medidas					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Base craneal anterior	65,3	73,6 ± 3,0	-8,3	-xx	Hipoplasia
Cuerpo mandibular	75,6	73,6 ± 5,0	2,0		Mesognatia
Base craneal posterior	28,5	33,5 ± 3,0	-5,0	-x	BraquiFacial
Altura de la rama	48,7	46,6 ± 5,0	2,0		MesoFacial
B.Cr.Post / Altura Rama	0,6	0,8 ± 0,3	-0,2		MesoFacial
Angulo de la silla	124°	122° ± 5°	2°		Clase I Osea
Angulo articular	144°	143° ± 6°	1°		MesoFacial
Angulo goniaco	125°	130° ± 7°	-5°		MesoFacial
Suma total 1-2-3	392,9	396,0 ± 6,0	-3,1		MesoFacial
Angulo goniaco superior	50°	54° ± 2°	-4°	-xx	DólicoFacial
Angulo goniaco inferior	75°	73° ± 3°	3°	x	DólicoFacial
Altura facial anterior	114,4	112,5 ± 7,5	1,9		MesoFacial
Altura facial posterior	73,6	77,5 ± 7,5	-3,9		MesoFacial
A.Fac.Post / A.Fac.Ant	64,4	63,5 ± 1,5	0,9		MesoFacial
SNA	83°	82° ± 2°	1°		Normotrusión
SNB	84°	80° ± 2°	4°	x	Retrusión
ANB	-1°	2° ± 2°	-3°	-x	Clase III
IS - Plano Palatal	117°	110° ± 2°	7°	xxx	Aumentado
IMPA	85°	90° ± 3°	-5°	-xx	Disminuido


Axiográfico					
Medida:	Valor	Media	Dif	Unid Des	Clase
Plano AxOr	7°	0° ± 1°	7°	xxxxx	

- Base craneal anterior hipoplásica.
- Suma de ángulos: mesofacial.
- Angulo goníaco superior disminuido.
- IMPA 85, disminuido.
- SNB clase III.

CONCLUSIONES CEFALOMETRICAS

- Ricketts: Clase III esquelética, a causa mandibular.
Braqui facial severo.
- McNamara: Pogonion adelantado respecto a perpendicular.
Exceso de 15 mm de longitud mandibular (normas compuestas).
- Roth - Jaraback: Base craneal anterior hipoplásica.
Suma de ángulos: biotipo meso facial.
Angulo goníaco superior disminuido.
IMPA disminuido.
SNB clase III.

SUPERIOR



- Dentición permanente.
- Forma del Arco: ovoideo.
- Coincidencia de linea media ósea y dentaria.
- Mayor desarrollo transversal de hemimax izq.
- Paladar: ovoideo y mediano.
- Número de piezas: 12

Alteraciones de posición: 16 mesio rotación.

15 palato posición.

14 palato posición.

12 mesio rotación.


22 mesio rotación.

26 mesio rotación.


25 disto rotación.

- Diastemas: 24-23.
11-21.
21-22.
23-24.

INFERIOR




- Dentición permanente.
- Forma del Arco: ovoideo.
- Coincidencia de linea media ósea y dentaria.
- Desarrollo transversal simétrico.
- Número de piezas: 14
- Alteraciones de posición: 35 mesio rotación.
 34 mesio rotación.
 33 disto rotación.
 31 mesio rotación.
 41 disto rotación.
 43 mesio rotación.
 45 mesio rotación.



PLANO TRANSVERSAL


- Lineas medias interincisivas coincidentes.
- Relación posterior normal.



PLANO SAGITAL

DERECHA

- Relación molar: clase III.
- Relación canina: clase III.
- Overjet: 0.



IZQUIERDA


- Relación molar: clase III.
- Relación canina: clase III.
- Overjet: 0.



PLANO VERTICAL

- Overbite: 0.

CURVA DE SPEE



- Derecha: 2 mm.



- Izquierda: 2 mm.

INDICE DE BOLTON

RELACION TOTAL:

10	6	6.5	8	6	9	9	6	8	6.5	6.5	10
10	6.5	6.5	7	6	5.5	5.5	6	7	6.5	7	10

- Suma 12 mandibulares = $\frac{83.5}{91.5} \times 100 = 91.25 \% (91,3\% \pm 0,26 \text{ normal})$
- Suma 12 maxilares =

★Proporción normal de diámetros mesio distales totales.

RELACION ANTERIOR:

8	6	9	9	6	8
7	6	5.5	5.5	6	7

- Suma 6 mandibulares = $\frac{37}{46} \times 100 = 80.43 \% (77,02\% \pm 0,22 \text{ normal})$
- Suma 6 maxilares =

★1.5 mm de exceso dentario mesio distal mandibular.

DIAGNÓSTICO GNATOLÓGICO

Paciente sin segundo molar superior erupcionado, menor de 13 años, con diagnóstico de clase III, no amerita el montaje en céntrica y el estudio gnatológico.



DISCREPANCIA DENTARIA

SUPERIOR

- TOTAL: +2.

INFERIOR

- Diascrepancia: -1.
- Curva de Spee: -2.
- TOTAL: -3.

SINTESIS DIAGNOSTICA

- DIAGNÓSTICO ESQUELETAL: Clase III (a causa mandibular).
Biotipo Braquifacial.
- ESTETICO: Perfil recto.
Tercio Inferior aumentado.
Desvio del mentón a la izquierda.
- DIAGNÓSTICO DENTARIO: Clase III.
- DIAGNÓSTICO FUNCIONAL: Respiración nasal.
Deglución madura.
Masticación unilateral alternada.

PRONOSTICO

	FAVORABLE	RESERVADO	DESFAVORABLE
EDAD			X
BIOTIPO		X	
GRAVEDAD DE LA DISGNACIA		X	
ETIOLOGIA		X	
COLABORACION	X		
FAMILIA	X		
PSICOLOGICO	X		

PROBLEMAS A RESOLVER

ESTETICO

- Perfil recto.
- Tercio inferior aumentado.
- Desvío del mentón a la izquierda.
- Angulo de Legan disminuido.

DENTARIO

- Diastemas superiores.
- Alteraciones de posición.
- Clase canina y molar III.
- Overjet y overbite valor 0.
- Ausencia de guía anterior.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

- 1 - Cierre de espacios.
- 2 - Lograr clase I canina bilateral.
- 3 - Conseguir una correcta guía anterior.
- 4 - Mejorar el perfil.

PLAN DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DENTARIAS:

- Alineado y nivelado.
- Extracciones 3.5 y 4.5.
- Stripping antero inferior (1.5 mm).
- Cierre de espacios.

MEDIO TERAPEUTICO:

- Aparatología fija con arco recto.
- Anclaje medio inferior.

Atención clínica

13 DE ABRIL DE 2017

- Arco superior NiTi 0,14.



- Armado superior, sistema arco recto.
- Tubos en 16 y 26.

27 DE MAYO DE 2017

- Arco superior NiTi 0,14.



- Arco inferior coaxial 0,14.




- Armado inferior.
- No se toma el 3.5 y 4.5 (indicación de extracción).

1 DE JULIO DE 2017

- Arco superior NiTi 0,14.



- Arco inferior NiTi 0,14.
- (con doblez distal)



- Gomas de separar inferiores.
- Extracción 3.5 y 4.5.

15 DE JULIO DE 2017

- Arco superior NiTi 0,18.



- Arco inferior NiTi 0,14.
- (con doblez distal)



- Cementado bandas en 3.7 y 4.7.
- Cadena elástica de 4 a 6 inferior.
- Ligadura metálica en 34 y 44.

12 AGOSTO DE 2017

- Arco superior NiTi 0,18.



- Arco inferior NiTi 0,14.
- (con doblez distal)




- Cadena elástica de 4 a 6 inferior.
- Ligadura metálica en 34 y 44.

16 DE SETIEMBRE DE 2017

- Arco superior NiTi 16 x 22.



- Arco inferior NiTi 16 x 16.
- (con doblez distal)



- Cadena elástica de 4 a 6 inferior.
- Ligadura metálica en 34 y 44.
- EMPEZAMOS A LOGRAR OVERBITE !!

28 DE OCTUBRE DE 2017

- Arco superior NiTi 16 x 22.



- Arco inferior NiTi 16 x 16.
- (con doblez distal)



- Gomas clase III 3/16 suaves de 13 a 43.
- Gomas clase III 3/16 suaves de 23 a 33.



- Conjugado 37, 36, 34.
- Conjugado 47, 46, 44.
- Ligadura 34 y 44.

25 DE NOVIEMBRE DE 2017

- Arco superior NiTi 16 x 22.



- Arco inferior NiTi 16 x 16.
- (con doblez distal)



- Gomas clase III 3/16 suaves de 13 a 43.
- Gomas clase III 3/16 suaves de 23 a 33.



- Recementado de 22 (le faltaba tip).

23 DE DICIEMBRE DE 2017


- Arco superior NiTi 16 x 22.



- Arco inferior NiTi 16 x 22.
- (con doblez distal)



- Gomas clase III 3/16 suaves de 13 a 43.
- Gomas clase III 3/16 suaves de 23 a 33.





- Conjugado 11, 21.
- Conjugado 37, 36, 34.
- Conjugado 47, 46, 44.

24 DE FEBRERO DE 2018

- Arco superior NiTi 17 x 25.



- Arco inferior NiTi 17 x 25.
- (con doblez distal)



- Gomas clase III 3/16 suaves de 13 a 43.
- Gomas clase III 3/16 suaves de 23 a 33.





- Resorte de espiras abiertas de 24 a 23.
- Resorte de espiras cerradas de 33 a 34 y de 43 a 44.

14 DE ABRIL DE 2018

- Arco superior NiTi 0,16.



- Arco inferior NiTi 19 x 25.
- (con doblez distal)



- Reposicionado de 23 (mas mesial e inclinado, darle mas tipo y disto rotar).
- Conjugado de 12 a 22.

26 DE MAYO DE 2018

- Arco superior NiTi 16 x 22.



- Arco inferior Acero 19 x 25.
- (con doblez distal)




- Poste crimpado a distal de caninos.
- Resorte comprimido entre 22 y 23 (mesializar 22).
- Resorte NiTi de 7 inferior a postes.

14 DE JULIO DE 2018

- Arco superior NiTi 16 x 22.



- Arco inferior Acero 19 x 25.
- (con doblez distal)



- Ya mesializó el 22.
- Resorte comprimido entre 42 y 43 (distalizar 43), vamos a ir corriendo a la derecha 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 36, 37 (de esta manera corregimos linea media inferior).

11 DE AGOSTO DE 2018

- Arco Superior 16 x 22 NiTi.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.



- Recementado tubo 36.
- Conjugado de 46 a 43.
- Cadena elastica de 43 a 42 (buscamos que colapse algo para ganar overjet).

1 DE SETIEMBRE DE 2018

- Arco Superior 16 x 22 NiTi.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.



- Conjugado de 46 a 44.
- Comprimido de 43 a 42 (distalización de 43).
- Espiras cerradas de 42 a 41.

15 DE SETIEMBRE DE 2018

- Arco Superior 16 x 22 NiTi.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.



- Conjugado de 47 a 44.
- Cadena de 44 a 43.
- Se levanta apenas la mordida con ionomero en molares posteriores.




29 DE SETIEMBRE DE 2018

- Arco Superior 16 x 22 NiTi.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.



- Conjugado de 47 a 44.
- Cadena de 44 a 42.

10 DE NOVIEMBRE DE 2018

- Arco Superior 0,16 NiTi.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.



- Cambio posición bracket 13 y 23 (más TIP).
- Stripping entre 41 y 31.
- Conjugado de 47 a 44.
- Cadena de 44 a 35.

8 DE DICIEMBRE DE 2018

- Arco Superior 17 X 25 NiTi.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.




- Conjugado de 46 a 34.
- Cadena de 36 a 34.

9 DE FEBRERO DE 2019

- Arco Superior 19 X 25 Acero.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.




- Conjugado de 46 a 34.
- Comprimido entre 36 y 37, doblez distal.
- Comprimido entre 21 y 22 y poste a 1 mm de distal del 22 para frenar.

23 DE FEBRERO DE 2019

- Arco Superior 19 X 25 Acero.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.




- Comprimido entre 11 y 21.
- Comprimido entre 36 y 37, doblez distal.
- Conjugado de 46 a 34.
- Cadena entre 36 y 34.

16 DE MARZO DE 2019

- Arco Superior 19 X 25 Acero.



- Arco Inferior 19 x 25 Acero.




- Conjugado de 21 a 25.
- Cadena de 12 a 21.
- Redondeado arco en zona de 37 para que venga solo.

30 DE MARZO DE 2019

- Arco Superior 19 X 25 Acero.



- Arco Inferior 16 x 22 Acero.
- (con doblez de primer orden en zona anterior)



- Retiro de brackets antero inferiores.
- Contención inferior.




- Cadena de 33 a 37 (pequeño diastema entre 34 y 36).
- Cadena de 16 a 26.

Áreas de superposición


C/ TRATAMIENTO

- Inicial (negro): Abril de 2017.
- Final (azul): Junio de 2019.




Ba-Na en CC - Evaluación del Mentón

- Cierre del eje facial de 96° a 97° - **Ante rotación mandibular.**
- Cierre del ángulo del eje facial que modifica la A.F.I., pasa de 44° a 43° .




Ba-Na en Na - Evaluación del Punto A

- Pasó de 67° a $66,5^\circ$ - **Cambio en el Punto A por Remodelación Ósea.**
- Cambio seguramente producido por variación del torque incisivo.




Eje del cuerpo mandibular en Pm - Evaluamos II y M

- Cambio en el eje de los incisivos debido al tratamiento.
- Disminución en la longitud del arco debido al tratamiento.
- Modificación del plano oclusal, se intruyó a nivel posterior.
- Disminución del IMPA.




Plano Bi Espinal en ANS - Evaluamos IS y M

- Leve extrusión de IS y disminución del torque debido al tratamiento.
- Leve extrusión molar y ligera migración mesial.




Plano Estético de Ricketts en comisura - Perfil Blando


- Disminuye la protrusión labial inferior de -2.2 a -6 mm.



Retiro y contenciones



- Retiro de aparato.
- Contención removible superior (Hawley).




- Instalación de placa de Hawley.


Fotos finales




ABRIL DE 2017



ABRIL DE 2019



ABRIL DE 2017



ABRIL DE 2019



ABRIL DE 2017



ABRIL DE 2019





*AGRADECIMIENTOS: Dr. Martin Zepedeo
Especialista en ortodoncia y ortopedia UDELAR*

