Rev. Uru. Ortop Ortod Nº3 Enero. –Jul 2019 p.122-157 ISSN: 2393-767X

CASO CLINICO

Recibido: Marzo 2019
Aceptado: Junio 2019

EVOLUCIÓN DE TRATAMIENTO CON PISTAS DIRECTAS DE MORDIDA CUBIERTA EN PRIMERA DENTICIÓN- CONTROL A DISTANCIA

EVOLUTION OF TREATMENT WITH DIRECT TRACKS OF COVERED BIT IN FIRST DENTITION- REMOTE CONTROL

Paciente : Nicolás, 4 años

Clinica de Prevención y Ortopedia IUCEDDU


Dra. Lorena Carbone

Especialista en Prevención, Ortopedia y Ortodoncia MF


inst.univ.ceddu@gmail.com

Examen clínico









El paciente ingresa a la Clínica de Prevención en agosto de 2008, con 4 años de edad.


Antecedentes médicos: nacimiento por parto natural, amamanto hasta los 20 meses. Alérgico respiratorio, tratado con medicación.

Hábitos: mamadera hasta hace poco tiempo.

Desarrollo psicológico acorde a su edad cronológica.

Actitud postural: normal.

Inicio agosto 2008





-Dentición caduca.
-Clase I canina y plano postlácteo recto.
-Líneas medias coincidentes.
-Overbite aumentado.
-Ceo= 0.





Arcadas iniciales






Sin diastemas, ni espacios simiescos



Estudio de modelos








Síntesis diagnostica

- Biotipo braquifacial, al examen clínico, tercios faciales proporcionados.
- Evaluación dentaria: Dentición caduca pura, líneas medias coincidentes, plano postlácteo recto.


  Mordida cubierta dentaria.
- Evaluación funcional: Disfunción masticatoria y deglutoria.
- Evaluación estética: Perfil recto.

Tratamiento
inicio - diciembre 2008






Pistas directas Planas
y equilibrado oclusal





control














Control febrero 2009











Marzo 2009
pistas directas inferiores










OPT Abril 2009



La ortopantomografía muestra fórmula dentaria completa.

Teleradiografía –Abril 2009



-Plano oclusal paralelo a plano de Camper, favorable.
-Vía aérea permeable.
-Hioides bien ubicado.

Control abril 2009









Pistas inferiores extendidas







Control mayo 2009, equilibrado oclusal en caninos










Arcadas dentarias –mayo 20019







Control julio 2009, suplemento pdp superiores











Arcadas dentarias – julio 2009







Abril 2010
alta controlada












Arcadas dentarias – Abril 2010









Se logra isodaquia y se diasteman ambas arcadas

Control - julio 2010

Comienza recambio anterior









Arcadas dentarias – Julio 2010







Control - diciembre 2010










Arcadas dentarias – Dic.2010







Control 2011









Arcadas dentarias - 2011







Secuencia de tratamiento temprano











JUNIO 2015


REVALUACIÓN DEL CASO CLINICO PARA ALTA CONTROLADA

Dra. Leticia Rizzo
Clinica de Prevención y Ortopedia IUCEDDU

inst.univ.ceddu@gmail.com

JUNIO 2015





Cornetes hipertróficos. Las piezas están en sus respectivos corredores de erupción en el arco dentario. Ligera verticalización de 16 y 26

Hipertrofia amígdala faríngea y poco desarrollo seno frontal. Paciente alérgico crónico. Correcta inclinación incisivos con sus bases óseas.

MAYO 2017



MARZO 2018

ALTA CONTROLADA









Bloqueo eruptivo del 47. Se indica extracción 3os. molares

AFMP SIMETRICOS

Nicolás es un paciente que tiene como factor de riesgo latente la insuficiencia respiratoria crónica debido a su terreno alérgico respiratorio.
Es un paciente de control y abordaje interdisciplinario.



No obstante ha tenido un muy buen desarrollo de sus estructuras dento maxilo faciales, atendiendo a crearle un plano oclusal funcional y una masticación fisiológica desde la primera dentición.

El establecimiento de la guía incisiva funcional desde la etapa de dentición temporaria es una referencia esencial para la funcionalidad del aparato masticatorio

ALTA CONTROLADA MARZO 2019









ALTA CONTROLADA MARZO 2019

Se realizó la exodoncia de los 4 terceros molares
Erupcionó el 47 que tenía un bloqueo con el 48

Se constata a través del video la correcta funcionalidad mandibular en lateralidades y protrusión, con guía incisiva anterior funcional y función de grupo posterior propios de la etapa de dentición permanente joven.

Estabilidad de los resultados del tratamiento sin dispositivo de contención en el control realizado con intervalo de un año.

VIDEO

